SÄUGETIERKUNDLICHE INFORMATIONEN

Band 5	2003	Heft 27
Inhalt		
des harten Gaumens bei mitt	llen Variabilität der Oberflächenstruktur teleuropäischen Landraubtieren (Fissipe nmarder (<i>Martes foina</i> , Mustelidae)	edia) – Einführung
	es über die Ure, Wisente und Elche Ost und Elchen nach Brandenburg	
	pekte überwinternder Fransenfledermäu hen künstlichen Quartieren des Ostthüri	
	TZ, M., KIERDORF U. & V. WOLTERS sserfledermäuse (<i>Myotis daubentonii</i>) im	_
NICHT, M.: Subcutane Inva	sion von Säugetieren (Mammalia) durch	h Zecken (Ixodoidea)305
PAGEL, HU.: Ressourcena	ngebot und Bibernahrung in der Vegeta	tionsperiode309
the state of the s	otizen zur Verbreitung und aktuellen Be ricetus (L., 1758) im südlichen Sachsen	
KAYSER, A.: Internationale	Bestrebungen zum Schutz des Feldhan	nsters355
Kleine Mitteilungen		
	alpa europaea) entgeht Zugriff eines Heacht ins Wasser	
	ER: Zwei neue Nachweise der Wildkatz perre/Ostthüringen	
The second contract of	Hinweise auf das Vorkommen der Klein im Mittleren Saaletal bei Jena	
Schriftenschau	276, 3	04, 345–346, 354, 359–361
Literaturzitate	* · · · ·	344